

5. 述語と集合

植野真臣

電気通信大学 情報数理工学コース

スケジュール

10月 8日：第1回 命題と証明
10月 15日：第2回 集合の基礎、全称記号、存在記号
10月22日：第3回 命題論理
10月29日：第4回 述語論理
11月 5日：第5回 述語と集合
11月12日：第6回 直積と冪集合
11月19日：第7回 様々な証明法 (1)
12月 3日：第8回 様々な証明法 (2)
12月10日：第9回 様々な証明法 (再帰的定義と数学的帰納法)
12月17日：第10回 中間試験
1月 7日：第11回 写像 (関数) (1)
1月21日：第12回 写像 (関数) (2)
1月28日：第13回 写像と関係：二項関係、関係行列、グラフによる表現
2月 4日：第14回 同値関係
2月 6日：第15回 順序関係：半順序集合、ハッセ図、全順序集合、上界と下界
2月18日：第16回 期末試験 (補講があればずれていきます。)

1. 本日の目標

1. 先週までの復習
2. 述語論理と集合
3. 集合演算の述語論理による証明
4. 集合のもう一つの内包的記法

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語 \Rightarrow 真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語 \Rightarrow 真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算 \Rightarrow 述語

$A \cap B$ の述語表現はどのようになるのか？

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語 \Rightarrow 真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算 \Rightarrow 述語

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語⇒真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算⇒述語

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$A \cup B$ の述語表現はどのようになるのか？

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語⇒真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算⇒述語の真理集合

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$$A \cup B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語⇒真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算⇒述語の真理集合

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$$A \cup B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

A^c の述語表現はどのようになるのか？

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語⇒真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算⇒述語の真理集合

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$$A \cup B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A^c \Leftrightarrow \{x | \neg(x \in A)\}$$

$A \subseteq B$ の述語表現はどのようになるのか？

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語⇒真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算⇒述語の真理集合

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$$A \cup B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A^c \Leftrightarrow \{x | \neg(x \in A)\}$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x [x \in A \rightarrow x \in B]$$

$A = B$ の述語表現は？

2. 先週の復習： 述語と集合は等価

述語⇒真理集合

$$P(x) \Rightarrow \{x | P(x)\}$$

集合演算⇒述語の真理集合

$$A \cap B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$$A \cup B \Leftrightarrow \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A^c \Leftrightarrow \{x | \neg(x \in A)\}$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x [x \in A \rightarrow x \in B]$$

$$A = B \Leftrightarrow \forall x [x \in A \leftrightarrow x \in B]$$

2. 先週の復習 :

空ゆえに真
(vacuously true, vacuous truth)

問題 1

$\neg(\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)])$
 $\equiv \exists x [P(x) \rightarrow \neg Q(x)]$
は真である。

解答

$\neg(\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)])$
 $\equiv \exists x [P(x) \rightarrow \neg Q(x)]$
は真である。

解答

$\exists x [P(x) \rightarrow \neg Q(x)]$
 $\equiv \exists x [\neg P(x) \vee \neg Q(x)]$
述語 $P(x)Q(x)$ のどちらかが偽である x がある
 $\rightarrow P(x)Q(x)$ の真理集合以外から x を選べばよいので絶えず真

解答

$\neg(\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)])$
 $\equiv \neg(\forall x [\neg P(x) \vee Q(x)])$
 $\equiv \exists x [\neg(\neg P(x) \vee Q(x))]$
 $\equiv \exists x [\neg\neg P(x) \wedge \neg Q(x)]$
 $\equiv \exists x [P(x) \wedge \neg Q(x)]$

2. 命題論理の復習問題

$A \subseteq B$ の定義を述べよ。

2.命題論理の復習問題

$A \subseteq B$ の定義を述べよ.

$$A \subseteq B$$

$$\Leftrightarrow \forall x[x \in A \rightarrow x \in B]$$

19

問題 2

$A \subseteq B$ の否定は？

$$A \not\subseteq B$$

20

問題 2

$A \subseteq B$ の否定は？

$$A \not\subseteq B$$

$$\Leftrightarrow \exists x[x \in A \rightarrow x \notin B]$$

21

解答

$A \subseteq B$ の定義を述べよ.

$$A \not\subseteq B$$

$$\Leftrightarrow \exists x[x \in A \rightarrow x \notin B]$$

22

解答

$A \subseteq B$ の定義を述べよ.

$$A \not\subseteq B$$

$$\Leftrightarrow \exists x[x \in A \rightarrow x \notin B]$$

$x \notin A$ を選べば真

$\exists x \in A[x \notin B]$ ならばよい

23

解答

定義に戻れ！！

$$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \neg \forall x[x \in A \rightarrow x \in B]$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg [x \in A \rightarrow x \in B]$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg [\neg x \in A \vee x \in B]$$

$$\Leftrightarrow \exists x [x \in A \wedge \neg x \in B]$$

24

問題3

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$
は真か偽か？証明もせよ。

問題3

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$
は真か偽か？証明もせよ。

解答

偽

反例を示せばよい

$x = 5$ のとき $(5-4)^2 = 1 > 0$ となり

$\exists x \in \mathbb{R} [(x-4)^2 < 0 \wedge x = 5]$

$(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$ は偽 ■

問題3

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$
は真か偽か？証明もせよ。

解答

偽

反例を示せばよい

$x = 5$ のとき $(5-4)^2 = 1 > 0$ となり

$\exists x \in \mathbb{R} [(x-4)^2 < 0 \wedge x = 5]$

$(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$ は偽 ■

問題3

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$

は真か偽か？

解答 真

証明

$(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5 \Leftrightarrow \neg[(x-4)^2 < 0] \vee [x = 5]$

$\Leftrightarrow [(x-4)^2 \geq 0] \vee [x = 5]$

$(x-4)^2 \geq 0$ は真であり、右辺は真。

従って $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$ は真 ■

問題4

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$
を集合演算を用いて証明せよ。

問題4

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$
を集合演算を用いて証明せよ。

解答

$\{x | (x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5\}$

$\Leftrightarrow \{x | (x-4)^2 < 0\}^c \cup \{x | x = 5\}$

$\Leftrightarrow \{x | (x-4)^2 \geq 0\} \cup \{x | x = 5\}$

$\mathbb{R} = \{x | (x-4)^2 \geq 0\}$

より $\{x | (x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5\} = \mathbb{R}$

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について

$(x-4)^2 < 0 \rightarrow x = 5$ ■

問題5

普遍集合 U に対し、 $\forall B[\emptyset \subseteq B]$ を証明せよ。

問題5

普遍集合 U に対し、 $\forall B[\emptyset \subseteq B]$ を証明せよ。

[証明]定義に戻れ

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x[x \in A \rightarrow x \in B]$$

$$\forall x \forall B[x \in \emptyset \rightarrow x \in B]$$

空ならば真が示せればよい。

$$\forall x \forall B[x \in \emptyset \rightarrow x \in B]$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall B[x \in \{\emptyset^c \cup B\}]$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall B[x \in \{U \cup B\}]$$

$$\Leftrightarrow \forall x[x \in U] \text{ は常に真。したがって}$$

$$\text{普遍集合 } U \text{ に対し、} \forall B[\emptyset \subseteq B]$$

問題6 以下を述語論理を用いて証明せよ。

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

[証明]

$$A - (B \cup C) \Leftrightarrow \{x|x \in A\} \cap \{x|x \notin (B \cup C)\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in A\} \cap \{x|x \in (B \cup C)^c\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in A\} \cap \{x|x \in (B^c \cap C^c)\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in A\} \cap \{x|x \notin B \wedge x \notin C\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in A \wedge x \notin B\} \cap \{x|x \in A \wedge x \notin C\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in (A - B)\} \cap \{x|x \in (A - C)\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in (A - B) \cap (A - C)\}$$

$$\Leftrightarrow (A - B) \cap (A - C)$$

問題7

分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ を述語論理を用いて証明せよ。

問題7

集合演算分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ を述語論理を用いて証明せよ。

[証明]

$$A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow \{x|(x \in A) \vee (x \in (B \cap C))\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|(x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in C)\}$$

命題演算の分配律を用いると

$$\Leftrightarrow \{x|(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|(x \in A \cup B) \wedge (x \in A \cup C)\}$$

$$\Leftrightarrow \{x|x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)\}$$

なぜ、命題論理の分配律を用いてよいのか？

$(x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in C)$
 $\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$
この分配律の命題論理は真理値表で証明できるので集合の分配律の基底をなすものである。命題論理が数学の基底である。

37

注意！！
次の文は命題か？述語か？

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

38

注意！！
次の文は命題か？述語か？

$\forall x \in \mathbb{R}$ について
 $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
 \Rightarrow 全称命題

恒等式では「 $\forall x \in \mathbb{R}$ について」が隠れている！！

39

以下を証明せよ。

$$(x + 1)^2 \neq x^2 + 4x + 1$$

40

解答

$(x + 1)^2 \neq x^2 + 4x + 1$
 \Leftrightarrow
 $\neg(\forall x \in \mathbb{R}[(x + 1)^2 = x^2 + 4x + 1])$
 \Leftrightarrow
 $\exists x \in \mathbb{R}[(x + 1)^2 \neq x^2 + 4x + 1]$
を示せばよい。
 $x = 1$ について $(x + 1)^2 = 4$
 $x^2 + 4x + 1 = 6$
となり $\exists x \in \mathbb{R}[(x + 1)^2 \neq x^2 + 4x + 1]$ ■

41

再掲

述語「 $x + 1 = 2$ 」を $P(x)$ と書く。
このとき、以下の真偽は？

- (1) $x \in \mathbb{N}[P(x)]$
- (2) $\forall x \in \mathbb{N}[P(x)]$
- (3) $\exists x \in \mathbb{N}[P(x)]$

42

再掲

述語「 $x + 1 = 2$ 」を $P(x)$ と書く。
このとき、以下の真偽は？

- (1) $x \in \mathbb{N}[P(x)]$ は命題ではない
- (2) $\forall x \in \mathbb{N}[P(x)]$
- (3) $\exists x \in \mathbb{N}[P(x)]$

再掲

述語「 $x + 1 = 2$ 」を $P(x)$ と書く。
このとき、以下の真偽は？

- (1) $x \in \mathbb{N}[P(x)]$ は命題ではない
- (2) $\forall x \in \mathbb{N}[P(x)]$ は偽
- (3) $\exists x \in \mathbb{N}[P(x)]$

再掲

述語「 $x + 1 = 2$ 」を $P(x)$ と書く。
このとき、以下の真偽は？

- (1) $x \in \mathbb{N}[P(x)]$ は命題ではない
- (2) $\forall x \in \mathbb{N}[P(x)]$ は偽
- (3) $\exists x \in \mathbb{N}[P(x)]$ は真

3. 集合の記法

再掲（2章の3. 集合の「要素」の記法）

外延的記法 : $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{3, 2, 5, 1, 4\}$
(有限集合)

$A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ (無限集合)

内包的記法 : $A = \{n | n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 5\}$
 $A = \{n | n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 5, n \text{ は奇数}\}$

これまで習ってきた内包的記法と述語

これまで習ってきた内包的記法は

$$A = \{x | P(x)\}$$

述語の真理集合

問題

$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \text{ は奇数}\}$
の「 n は奇数」を数式で表したい。

どのように表せるか？

問題

$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \text{は奇数}\}$
の「 n は奇数」を数式で表したい。
どのように表せるか？

ヒント 述語での記述では

$$A = \{n | n \text{の条件1}, n \text{の条件2}, \dots\}$$

ここで n の条件は「論理積、かつ」「 \wedge 」の場合、「 $,$ 」で連ねる。

$$A = \{n | n \text{の条件1}\} \cap \{n | n \text{の条件2}\} \cap \dots$$

問題

$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \text{は奇数}\}$
の「 n は奇数」を数式で表したい。
どのように表せるか？

$$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}\}$$

問題

$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \text{は奇数}\}$
の「 n は奇数」を数式で表したい。
どのように表せるか？

$$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}\}$$

どのような k を表しているのかわからない！！

集合の積集合で示すと

$$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}\} = \{n | n \in \mathbb{N}\} \cap \{n | n = 2k + 1\} \cap \{n | k \in \mathbb{N}\}$$

$\{n | n = 2k + 1\}, \{n | k \in \mathbb{N}\}$
が意味をなさない
条件部に n 以外の変数がある場合には注意が必要

問題

$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \text{は奇数}\}$
の「 n は奇数」を数式で表したい。
どのように表せるか？

$$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \bmod 2 = 1\}$$

問題

$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \text{は奇数}\}$
の「 n は奇数」を数式で表したい。
どのように表せるか？

$$A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \bmod 2 = 1\} = \{n | n \in \mathbb{N}\} \cap \{n | n \bmod 2 = 1\}$$

もう一つの内包的記法

$$\{F(t)|t \in U\}$$

「 U のひとつひとつの要素 t について、 $F(t)$ で表される要素を考え、それらをすべて集めてできる集合」

55

もう一つの内包的記法

$$\{F(t)|t \in U\}$$

「 U のひとつひとつの要素 t について、 $F(t)$ で表される要素を考え、それらをすべて集めてできる集合」

例 $\{2n + 1|n \in \mathbb{N}\}$

「 \mathbb{N} のひとつひとつの要素 n について、 $2n + 1$ で表される要素を考え、それらをすべて集めてできる集合」

→ 「正の奇数集合」

56

もう一つの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では、

$E = \{2n + 1|n \in \mathbb{N}\}$ を x と n を用いて述語表現による内包的記法で表現せよ。

57

もうひとつの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では、

$E = \{2n + 1|n \in \mathbb{N}\}$ を x と n を用いて述語表現による内包的記法で表現せよ。

ヒント1

$$E = \{x|P(x)\}$$

x の条件をどのように n で表現するか？

58

もうひとつの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では、

$E = \{2n + 1|n \in \mathbb{N}\}$ を x と n のみの述語表現による内包的記法で表現せよ。

[解答]

$$E = \{x|n \in \mathbb{N}[x = 2n + 1]\}$$

59

もうひとつの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では、

$E = \{2n + 1|n \in \mathbb{N}\}$ を x と n のみの述語表現による内包的記法で表現せよ。

[解答]

$$E = \{x|n \in \mathbb{N}[x = 2n + 1]\}$$

60

意味：(述語 (条件)) : x は自然数 n について $x = 2n + 1$ を満たす

→

自然数 n がどのような n かわからないので命題として意味をなさない。

もうひとつの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では,

$E = \{2n + 1 | n \in \mathbb{N}\}$ を x と n のみの述語表現による内包的記法で表現せよ。

[解答]

$$E = \{x | \forall n \in \mathbb{N}[x = 2n + 1]\}$$

もうひとつの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では,

$E = \{2n + 1 | n \in \mathbb{N}\}$ を x と n のみの述語表現による内包的記法で表現せよ。

[解答]

$$E = \{x | \forall n \in \mathbb{N}[x = 2n + 1]\}$$

なぜ \forall でないのか？

$$E = \{x | \forall n \in \mathbb{N}[x = 2n + 1]\}$$

意味：(述語 (条件)) : x はすべての自然数 n について $x = 2n + 1$ を満たす

→ \emptyset

内包的記法での

$\{x | \forall n(P(x))\}$ は 全ての n について条件 $P(x)$ を満たす共通集合 $\bigcap_n \{x | P(x)\}$ という意味

もうひとつの内包的記法と述語

集合と述語は等価である。

では,

$E = \{2n + 1 | n \in \mathbb{N}\}$ を x と n のみの述語表現による内包的記法で表現せよ。

$$E = \{x | \exists n \in \mathbb{N}[x = 2n + 1]\} \rightarrow$$

各 n ごとに x が既定される

意味：(条件 : ある一つの自然数 n について $x = 2n + 1$)を満たす x を集めた集合
述語では、存在記号 \exists が補われている。

もうひとつの内包的記法と述語の変換

$$\{F(t) | t \in U\}$$

⇒

$$\{x | \exists t \in U[x = F(t)]\}$$

注) 存在量化子が隠されている。

内包的記法での

$\{x | \exists n[P(x)]\}$ は 全ての n について条件(述語) $P(x)$ を満たす和集合 $\bigcup_n \{x | P(x)\}$ という意味

二つの内包的記述の違い

$\{F(t)|t \in U\}$ は $F(t) = 2t + 1$ など演算になっている場合に便利。しかし、 t と $F(t)$ が同じ普遍集合でない場合は使えない場合もある。

内包型：集合 $F(t) = 2t + 1$ のような演算の記述が存在量子や他の変数を導入しなければならず面倒。演算がなく、条件が複数の場合は便利。

$$\{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x < 3, -1 \leq x < 4\}$$

というように集合が実数集合であるなどを規定することができる。

例題 1

2以上の偶数集合を二つの内包的記法で示せ。

例題 1

2以上の偶数集合を二つの内包的記法で示せ。

$$A = \{2n | n \in \mathbb{N}^+\}$$

$$A = \{x | \exists n \in \mathbb{N}^+ [x = 2n]\}$$

注意

述語では、普遍集合を前に出してよい。

$$\{x \in \mathbb{N}^+ | x \bmod 2 = 0\}$$

利点：自然数の集合であることがすぐに分かる。

$\{2n | n \in \mathbb{N}^+\}$ は自然数の部分集合だとわかる。

しかし $\{\sqrt{n} | n \in \mathbb{N}^+\}$ は何の集合かがわからない。

例題2

$$D = \{x | x \in \mathbb{R}, -2 \leq x < 3\}$$

について内包的記法

$$B = \{r^2 + 2r + 1 | r \in D\}$$

は簡単な述語による内包的記述に変換できる。それを求めよ。

例題2

$$D = \{x | x \in \mathbb{R}, -2 \leq x < 3\}$$

について内包的記法

$$B = \{r^2 + 2r + 1 | r \in D\}$$

は簡単な述語による内包的記述に変換できる。それを求めよ。

[正答]

述語 (内包的記法)

$$B = \{x | x \in \mathbb{R}, 0 \leq x < 16\}$$

例題3

以下はどのような集合か？

1. $\{x \in \mathbb{N} | \forall n \in \mathbb{N}(x > n)\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} | \exists n \in \mathbb{N}(x > n)\}$

例題3

解答

$$1. \{x \in \mathbb{N} | \forall n \in \mathbb{N}(x > n)\} \\ = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x \in \mathbb{N} | x > n\} = \emptyset$$

$$2. \{x \in \mathbb{N} | \exists n \in \mathbb{N}(x > n)\} \\ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in \mathbb{N} | x > n\} = \\ \{x \in \mathbb{N} | x > 0\} = \mathbb{N}^+$$

4. まとめ

1. 先週までの復習
2. 述語論理と集合
3. 集合演算の述語論理による証明
4. 集合のもう一つの内包的記法

演習問題

問題2

$\forall x \in \mathbb{N}$ について
 $x > 3$ ならば $x > 4$
は真か偽か？
証明せよ。

問題3

自由変数 $x \in \mathbb{R}$ について 述語
 $(x - 1)^2 < 0 \rightarrow x = 250$
は真か偽か？
証明せよ。

問題4

以下の集合演算を命題論理を用いて証明せよ。

1. $A \cup A = A$
2. $A \cup B = B \cup A$
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$
4. $A \subseteq (A \cup B)$
5. $A, B \subseteq C \rightarrow (A \cup B) \subseteq C$
6. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
7. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

問題5

$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ を証明せよ。

問題6 以下の記法を述語による内包的記法に書き変えよ。

(1) $A = \{2n^2 - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$

(2) $\mathbf{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 3\}$

$B = \{2r^2 + 3 \mid r \in \mathbf{D}\}$